

L'utilisation des médicaments : Pourquoi et comment ?

Partie B : Que faut-il savoir quand on prend des médicaments ?

Étiquette d'ordonnance (Rx) :

Tenir hors de portée des enfants.

Rx Pharmacie locale
123 Main St.
Happy Valley-Goose Bay, NL
709-555-2222

Rx #: 204991 Date: 4-fév-2024
Tamara Bing

UTILISER UNE PULVÉRISATION DANS CHAQUE NARINE UNE FOIS PAR JOUR
MOMETASONE PULVÉRISATEUR NASAL (50MCG/PULVÉRISATEUR)




 **BIEN AGITER**

 **Pour le nez**

Conserver à température de la pièce

NE PAS AVALER



L'utilisation des médicaments : Pourquoi et comment ?

Partie B : Que faut-il savoir quand on prend des médicaments ?

Étiquette d'ordonnance (Rx) :

Rx **Pharmacie locale**
123 Main St.
Lewisporte, NL
709-555-3333

Rx #: 212332 Date: 29-Mar-2024
Lola Martinez

utiliser selon les instructions

EPIPEN JR 0.15 MG/0.3ML

Tenir hors de portée des enfants.



AVERTISSEMENT : L'aiguille sort de l'embout orange. Ne pas mettre le pouce, les doigts ou la main sur l'embout orange. NE PAS retirer le dispositif de sécurité bleu avant d'être prêt à l'emploi.

Conserver à température de la pièce

L'utilisation des médicaments : Pourquoi et comment ?



Partie B : Que faut-il savoir quand on prend des médicaments ?

Étiquette d'ordonnance (Rx) :

Tenir hors de portée des enfants.

Rx **Pharmacie locale**
123 Main St.
Conception Bay South, NL
709-555-5555

Rx #: 200128 Date: 12-avr- 2024
Jamie Landry
PRENDRE 5ML 3 FOIS PAR JOUR PENDANT 10 JOURS.
AMOXICILLINE 250MG/5ML





BIEN AGITER
Conserver au réfrigérateur et
jeter les restes après 14 jours

L'utilisation des médicaments : Pourquoi et comment ?

Partie B : Que faut-il savoir quand on prend des médicaments ?

Étiquette d'ordonnance (Rx) :

Devant de la boîte :



Dos de la boîte :

Faits concernant les médicaments
<p>Principes actifs (dans chaque gramme)</p> <p>Gramicidine 0,26 mg (antibiotique) Polymyxine B 0,1 mg (Antibiotique) Lidocaïne HCl 45 mg (Analgésique)</p>
<p>Avertissement</p> <p>Pour usage externe uniquement</p> <p>Ne pas utiliser : dans les yeux, en cas d'allergie à l'un des ingrédients. Lors de l'utilisation de ce produit , éviter tout contact avec les yeux.</p> <p>En cas de contact, rincer à l'eau</p> <p>Tenir hors de portée des enfants</p>
<p>Mode d'emploi - Pour les adultes et les enfants de 2 ans et plus, - pour les enfants de 2 à 12 ans, l'application doit être supervisée par un adulte, - nettoyer la zone affectée et appliquer une petite quantité de ce produit sur la zone 1 à 3 fois par jour.</p>
<p>Autres informations</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conserver entre 15 et 30°C




L'utilisation des médicaments : Pourquoi et comment ?

Partie B : Que faut-il savoir quand on prend des médicaments ?

Étiquette d'ordonnance (Rx) :

Devant de la boîte :



Dos de la boîte :

Information
Principes actifs (dans chaque comprimé) Dimenhydrinate 50 mg (Analgésique)
Avertissement Ne pas donner aux enfants de moins de 2 ans Tenir hors de portée des enfants
Mode d'emploi <ul style="list-style-type: none">• Pour prévenir le mal des transports, la première dose doit être prise $\frac{1}{2}$ à 1 heure avant le début de l'activité (voyage en véhicule, bateau, avion).• Adultes : prendre 1 à 2 comprimés toutes les 4 à 6 heures, ne pas prendre plus de 8 comprimés en 24 heures, ou selon les recommandations d'un médecin.• Enfants (6-12 ans) : $\frac{1}{2}$ à 1 comprimé toutes les 6-8 heures, pas plus de 3 comprimés en 24 heures, ou selon les instructions du médecin.• Enfants (2-6 ans) : $\frac{1}{4}$ à $\frac{1}{2}$ comprimé toutes les 6-8 heures, pas plus de 1-$\frac{1}{2}$ comprimé en 24 heures, ou selon les instructions du médecin.



L'utilisation des médicaments : Pourquoi et comment ?

Partie B : Que faut-il savoir quand on prend des médicaments ?

Étiquette d'ordonnance (Rx) :


Suspension d'ibuprofène pour enfants
Ibuprofène 100 mg/5 mL
Suspension orale USP

- Soulage la douleur
- Réduit la fièvre

• **Pour les enfants de 2 à 12 ans**

ARÔME RAISIN

250 ml



Information		
Ingrédients actifs Ibuprofène (Soulage la douleur et réduit la fièvre)		
Mode d'emploi: Bien agiter avant l'emploi. Peut être pris tous les 8h. Ne pas utiliser pendant plus de 5 jours.		
Avertissement Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des ingrédients. Conserver hors de la portée des enfants.		
Dose		
Age	Poids	Dose
2-3	24-35 lb	6 ml
4-5	36-51 lb	12 ml
6-8	52-71 lb	16 ml
9-10	72- 89 lb	20 ml
11-12	90-100 lb	22 ml
Autre information • Conserver entre 15 et 30° celsius.		

À CONSOMMER AVEC DE LA
NOURRITURE

BIEN AGITER
AVANT UTILISATION