

CE QU'IL FAUT SAVOIR

Qu'est-ce que c'est?

La xylazine est un dépresseur



La xylazine est un médicament vétérinaire utilisé pour la sédation et le soulagement de la douleur chez les animaux. C'est un agoniste alpha-2 adrénergique non opioïde qui ralentit l'activité cérébrale et corporelle, entraînant la somnolence, le ralentissement du rythme cardiaque et de la respiration. Son utilisation chez l'humain n'est pas permise car les essais cliniques ont conclu à sa dangerosité.

On retrouve de plus en plus souvent de la xylazine mélangée à des opioïdes comme le fentanyl dans le trafic de drogue. Cette association augmente le risque de surdose et de décès. La xylazine peut également causer une vasoconstriction et perturber la circulation sanguine, ce qui peut entraîner des plaies et des ulcères cutanés graves, même dans les zones non injectées.



Comment est-elle utilisée?

La xylazine est généralement vendue sous forme de poudre. Elle peut être prise par voie orale, sniffée, fumée ou injectée.



En usage vétérinaire, la xylazine est administrée sous forme liquide par injection.

La xylazine est souvent ajoutée à d'autres drogues comme l'héroïne ou le fentanyl pour prolonger ou amplifier leurs effets.

Il peut également être ajouté à des comprimés contrefaits conçus pour ressembler à des opioïdes sur ordonnance. Par conséquent, certaines personnes peuvent consommer de la xylazine à leur insu.



Quels sont les effets?

La xylazine comporte un risque très élevé de surdosage et de décès.



Provoque une sédation profonde, une somnolence extrême et une perte de conscience.




Ralentit le rythme cardiaque et la respiration, surtout en association avec des opioïdes.



Peut causer une surdose mortelle par arrêt respiratoire.



Contrairement aux opioïdes les effets de la Xylazine ne sont pas annulés par la naloxone.



Provoque des plaies et des ulcères cutanés graves, même dans des zones autres que les points d'injection.



Les effets sont imprévisibles : une dose qui affecte une personne peut être mortelle pour une autre.

LA XYLAZINE

Page 2

Quand faut-il demander de l'aide d'urgence ?



Surdosage ou intoxication à la xylazine : la xylazine peut ralentir ou interrompre la respiration, entraînant une perte de conscience et la mort. Le risque est particulièrement élevé lorsqu'il est associé à des opioïdes comme le fentanyl. Il n'existe aucun antidote homologué contre la xylazine ; le traitement dépend donc des soins.

Signes : La personne peut devenir très somnolente, puis ne plus réagir et devenir impossible à réveiller. Elle peut présenter une respiration lente ou irrégulière, un rythme cardiaque ralenti ou une peau froide, pâle ou bleutée. Des plaies ou infections cutanées graves peuvent aussi être présentes. Il peut être difficile de faire la différence entre une sensation d'euphorie et une sédation dangereuse ; un diagnostic précoce est donc important.


C'est une urgence ! Appelez immédiatement le 911 et administrez de la naloxone si des opioïdes sont présents. Placez la personne en position latérale de sécurité et restez avec elle jusqu'à l'arrivée des secours.

Le saviez-vous ?

La xylazine est souvent mélangée à d'autres médicaments.

Au Canada, près de 8 échantillons de xylazine sur 10 contenaient de 2 à 4 autres substances, le fentanyl étant la plus courante.

Comment rester en sécurité ?



Si vous décidez malgré tout d'utiliser la xylazine, tenez compte des stratégies de réduction des risques suivantes :

- 1 Ne jamais utiliser seul.e : ayez quelqu'un à proximité ou utilisez des services supervisés.
- 2 Ayez toujours de la naloxone sur vous : si des opioïdes sont présents en association avec de la xylazine, elle peut inverser les effets des opioïdes.
- 3 Commencez par une faible dose et augmentez-la lentement : la puissance est imprévisible, même si vous avez déjà utilisé des drogues similaires.
- 4 Évitez de mélanger les substances, en particulier l'alcool ou d'autres médicaments déprimeurs.
- 5 Les soins des plaies sont importants : gardez-les propres et couvertes. Consultez un médecin rapidement pour prévenir toute infection.
- 6 Adoptez des pratiques plus sécuritaires : évitez d'injecter dans les plaies, nettoyez la peau avec de l'alcool avant utilisation et utilisez du matériel stérile (de nombreuses pharmacies fournissent gratuitement le matériel nécessaire).

Autres médicaments comme la xylazine

D'autres déprimeurs comme la médétomidine et la dexmédétomidine ont des effets similaires, mais sont jusqu'à 200 fois plus puissants que la xylazine. Ils sont moins courants que la xylazine, mais leur présence a été signalée dans le trafic de stupéfiants.

Pour davantage d'informations, rendez-vous sur : www.DECYDE.ca/fr

